

| Latijnse naam       | Nederlandse naam | Beharing blad                                   | Wortelblad (WB) ( of standaard blad)   | Stengelblad   | Stengel                                      | Totaal plant   | Bloeiwijze  |
|---------------------|------------------|---|--|---|--|--|---|
| Eryngium campestre  | Kruisdistel      | kaal  | dubbel veerdelig, bleek groen met witte aderen   | langer dan wortelbladen, verder hetzelfde                                 |  | Plant bleekgroen 0,15-0,60                                   | 10-20 H schutbladen lijn-lancetvormig                               |
| Eryngium maritimum  | Blauwe zeedistel | Kaal  | Rond, 3-5 lobbig   | groter dan wortelbladen   |  | Plant bleekgroen boven blauwig 0,30-0,60                     | 1-4 Hschutblad heeft 3 lange tanden                                 |
| Cirsium oleraceum   | Moesdistel       | Witdoornig gewimperd, kaal                      | Onderste B veerspletig tot ongedeeld, bovenste B ongedeeld en hartvormig stengelomvattend. B zacht, niet stekend             | Jongste WB vaak ongedeeld   | gegroeft, hol en nauwelijks behaart          | 0,60-1,50  | H omgegeven van grote geelgroene omwindselbladen                    |
| Cirsium arvense     | Akkerdistel      | BZ felgroen, kaal. OZ groenig, grijswit behaard | B diep gezaagd, bochtig veerspletig en sterk gekroesd of ongedeeld, vlak.  | niet stengelomvattend   | boven wollig en ongevleugeld, van onder kaal | 0,60-1,20  | H lichtpaars, vele hoofdjes   |
| Onopordum acanthium | Wegdistel        | Hele plant grijsviltig                          | B langwerpig of elleptisch, bochtig stekelig getand, Slippen met 5-10 mm lange stevige gele doornen.                         | B aflopend  | met brede (tot 15 mm) stekelige vleugels     | Na ± 1 jaar een grote grijsviltige rozet tot 1 m Ø 0,60-2,50 | H alleenstaand, roodpaars, OB lijnvormig, de onderste wijd uitstaan |
| Silybum marianum    | Mariadistel      | Plant wollig tot SW, maar snel kaal             | B gelobd met stevige doornen. WB langwerpig en bochtig veerlobbig in een korte steel versmalt. BZ langs de nerven wit gerand | lancetvormig en hartvormig stengelomvattend                               | vertakt, geen vleugels                       | 0,60 - 1,50  | Buitenste OB in een stekel eindigend. Hbodem dicht behaard          |
| Carlina vulgaris    | Driedistel       | OZ SW behaart                                   | Lancetvormig bochtig stekelig getand, OZ= uitstekend nerven netwerk  | Stengelbladeren worden naar beneden iets kleiner, verder hetzelfde als WB | Recht, kantig, viltig, rood aangelopen       | Plant leerachtig 0,15-0,45                                   | Weinig H 2-4, meestal 3   |

| Latijnse naam            | Nederlandse naam      | Beharing blad   | Wortelblad (WB) ( of standaard blad)  | Stengelblad                          | Stengel  | Totaal plant  | Bloeiwijze  |
|--------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| Carduus tenuiflorus      | Tengere distel        | BZ wollig behaard<br>OZ SW behaart  | Lancetvormig, bochtig gedoornt. Doornen lang, spits. BZ donkergroen OZ helderer                 | Hetzelfde als WB                     | SW behaart, breed gevleugeld                       | sterk vertakt vanaf het midden 0,15-1,30              | Smalle H in groepen samen   |
| Cirsium dissectum        | Spaanse ruiter        | BZ behaard, OZ SW   | B met zachte stekels, gaafrandig tot gelobd en dan met breed 3-hoekige gave slippen             | Zie WB                               | zonder vleugels, witviltig, duidelijk aanwezig     | 0,20-0,50(-1,00)                                      | 1 H   |
| Echinops sphaerocephalus | Beklierde kogeldistel | BZ kort klierharig en witviltig   | Gesteelt, langwerpig, gelobd, bladslippen met 3-hoekige einddoorn, Brand omgerold, zacht, groen | Blad geoord, verder hetzelfde als WB | Kantig, witviltig, bruin gestreept, boven beklierd | 0,60-2,00   | Bloeiwijze bolvormig  |
| Echinops exaltatus       | Stekelige kogeldistel | Lijkt op Beklierde Kogeldistel  | alleen heeft geen klierharen  |                                      |  |   |   |
| Carduus nutans           | Knikkende distel      | Jong blad met afzonderlijke haren, oude bladen snel kaal                  | gedeeld, beide kanten groen, glanzend met 6-8 delen, stekels hard, lang (4-8mm), wit            | Hetzelfde als WB                     | onder wollig behaart                               | 0,30-2,00   | H alleenstaand, knikkend. OB in gescheurd en naar buiten gebogen                |
| Carduus crispus          | Kruldistel            | BZ donkergroen (kaal?) OZ wit grijs, viltig met 1-cel haren 2-5 cel haren | alle B duidelijk diep gelobd, dubbel getand, zacht met zachte doornen, WB in de steel versmalt  | Zie WB                               | breed doornig gevleugeld, rechtopstaand            | 0,30-1,30   | H 1-5 bijeen aan eind van takken  |
| Carduus acanthoides      | Langstekelige distel  | OZ zonder eencellige haren  | Bladen gedeeld, stekels van slippen met stekels (tot 5 mm)                                      | Zie WB                               | Gevleugeld, stekels tot 5 mm                       | 0,30-1,30   | H alleenstaand (zelden met 2 of 3) middelste nerf van middelste OB uitspringend |
| Cirsium acuale           | Aarddistel            | BZ kaal, OZ borstelig behaart   | B sterk stekelig, veerspletig met 3-lobbige slippen. B kort gesteeld, stengel is bol aan OZ     | Zie WB                               | zeer kort (schijnbaar ontbrekend)                  | B alle in rozet, lange wortelstokken 0,05-0,10(-0,30) | 1 H   |

| Latijnse naam      | Nederlandse naam | Beharing blad  | Wortelblad (WB) ( of standaard blad)  | Stengelblad                  | Stengel  | Totaal plant  | Bloeiwijze   |
|--------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|---|--|
| Cirsium palustre   | Kale Jonker      | B wit vilthaarig?  | B lijnlancetvormig, bochtig veerspletig met 2-3 lobbige slippen. B met gele stekels   | B is aflopend, verder zie WB | Na ± 2 jaar slanke en hoge stengel, tot boven doornig gevleugeld en SW behaart | Rozet na ± 1 jaar zeer regelmatig, op de grond liggend. Plant donkergroen, soms rood aangelopen 0,60-1,50 | H roodpaars, vele hoofdjes   |
| Cirsium vulgare    | Speerdistel      | BZ stijf doornhaarig, OZ kroeshaarig tot witwollig (nooit witviltig) | B grote slippen. Slippen zijn 3-hoekig, lancetvormig, ongelijk van grootte en in 3-dimensionaal perspectief, aan uiteinde grote gele doorn. B heeft omgerolde rand, bladen aflopend | Zie WB                       | wollig behaard en bebladert gevleugeld   | Na ± 1 jaar een stevig rozet gevormd 0,60-1,20  | H 3-5 cm lang, paars. OB hoger dan breed, onder het midden het breedts |
| Cirsium eriophorum | Wollige distel   | BZ donkergroen, stekelig behaart, OZ kroeshaarig                     | B lange veerslippen, steken uit in alle richtingen, meestal tegenoverstaand. B heeft sterk omgerolde rand en niet aflopend  | Zie WB                       | niet gevleugeld  | Na ± 1 jaar een dicht rozet gevormd 0,60-1,20   | H kogelig, duidelijk wollig  |

#### Afkortingen

BZ: Bovenzijde

OZ: Onderzijde

SW:

spinnenwebachtig

g

B: Blad

WB: wortelblad

H:

bloemhoofdjes

OB: Omwindselbladen

Dit Schema is gemaakt door Marinka van Puijenbroek, met behulp van twee boeken: Heukels' Flora 23 druk en Flora Vegetativa - Stefan Eggenberg / Adrian Mohl als er fouten in zitten kan je dat doorgeven aan: [marinkapuijenbroek@gmail.com](mailto:marinkapuijenbroek@gmail.com)